

# Kommunikation om våld i nära relationer – Tandvård

## Faktablad



----

Hitta specifik information om kommunikationsstrategier, screeningfrågor eller hur du reagerar vid ett positivt svar om våld i [Modul 3](#).



----

Mer information om indikatorer i [Modul 2](#).

### Ett barn med en skadad framtand kan vara tecken på våld. “Är allt OK hemma?” (1)

Tandläkare har en unik möjlighet att identifiera offer för våld i nära relationer. Många våldsutsatta kanske inte är medvetna om att tandläkarmottagningen är en säker plats för att ta upp denna fråga. Därför är det viktigt att öka medvetenheten med hjälp av affischer, informationsbroschyrer och/eller pins på kappan.

Dessutom är det viktigt för tandvårdspersonal att lära sig hur man kommunicerar i samband med våld i nära relationer och vilka formuleringar som bör undvikas. Exempel kan hittas här:


Möjliga orsaker till att offer för våld i relationer inte tar upp sin utsatthet på tandläkarmottagningen: (2)

- Antagande om att tandläkaren inte har tillräckligt med tid
- Annan personals närvaro i rummet
- Språkbarriärer, t.ex. användning av familjemedlemmar som tolkar
- Antagande om att tandläkaren inte känner till företeelsen och inte är rätt person att kontakta
- Förlägenhet, osäkerhet, brist på förtroende
- Könet på den tandläkare som ger vård, t.ex. i ett privat samtal



Stöd för den dagliga verksamheten: (3)

- Fråga om våldsutsatthet som en del av **anamnesen**.
- **En kavajnál på rocken för att visa medvetenhet**
- **Förberett visitkort** med Kvinnofridslinjen och andra stödlinjer samt jourer.
- Affischer **med QR-koder och broschyrer t.ex. i väntrummet eller på toaletten**.





----

Personer med olika kulturella bakgrund kan ge uttryck för våldstecken på olika sätt. Var medveten om dina egna perspektiv, fördomar och stereotyper när du kommunicerar med ett potentiellt våldsoffer. Mer information finns i [Modul 8](#).

## Rutiner på tandläkarmottagningen:

### 1. Upptäcka - Anamnes/undersökning

o Finns det tecken på skador på huvud, ansikte och hals?

### 2. Ställa frågor

o Rutinmässiga frågor om orsakerna till skadan  
o Tyder undersökningen på en våldsamt historia?  
o Något psykologiskt märkbart beteende hos patienten?

### 3. Förutsättningar för samtal

o Ramverk för förtroendefulla samtal  
o Ställa tydliga och klara frågor  
o Visa empati  
o Lyssna aktivt

### 4. Resultat av samtalet

o Patienten nekar till att ha upplevt våld  
o Patienten bekräftar att ha upplevt våld och dokumentation sker. I vissa regioner finns s k skyddat sökord som bör användas.

## Användbara källor

De kan hittas [här](#):

- (1) Family violence handbook for the dental community, Donna Denham and Joan Gillespie, 1994, Health Canada. Accessed: 12.12.2023  
<https://publications.gc.ca/collections/Collection/H72-21-136-1995E.pdf>
- (2) Femi-Ajao, O. (2021). Perception of women with lived experience of domestic violence and abuse on the involvement of the dental team in supporting adult patients with lived experience of domestic abuse in England: a pilot study. International journal of environmental research and public health, 18(4), p.5 <https://www.mdpi.com/1660-4601/18/4/2024>
- (3) Jailwala, M., Timmons, J. B., Gül, G., Ganda, K. (2016). Recognize the Signs of Domestic Violence. Decisions in Dentistry, Accessed: 12.12.2023  
<https://decisionsindentistry.com/article/recognize-the-signs-of-domestic-violence/>

### Illustrationer

- (1) Person with question mark: Image by [storyset](#) on Freepik
- (2) Poster "Fight Domestic Violence": Poster by [Canva Creative Studio](#)
- (3) Booklet "Domestic Violence causes health problems": by [Frauenberatung e.V.](#)