

Violenza domestica: Reperti radiologici frequenti

Scheda Informativa

La seguente descrizione si riferisce in particolare alla violenza domestica (DV) diretta contro gli adulti (ad esempio il partner). Un aspetto ancora più rilevante viene assunto dal reperto radiologico nel campo degli abusi sui minori: i risultati radiologici infatti possono essere decisivi per l'individuazione della DV.

Gli elenchi non sono esaustivi, ma rappresentano solo una selezione.

Contattare un medico in caso di VD

- In molti casi, le vittime non denunciano la violenza domestica come causa di una lesione o di un ricovero in ospedale.
- Anche i casi in cui non è direttamente presente una lesione possono fornire indicazioni sulla violenza domestica.
- Le vittime di violenza domestica ricevono più spesso esami radiologici, soprattutto per i traumi fisici (in uno studio circa quattro volte più spesso rispetto ai controlli).



Trova le
immagini relative
ai **reperti
radiologici** [qui](#).

Lesioni comuni rilevabili con la diagnostica per immagini

- **Lesioni agli organi riproduttivi** (anche durante la gravidanza, ad esempio ematoma corionico)
- **Fratture recenti** (soprattutto nella regione facciale, ad esempio frattura delle ossa nasali, frattura del pavimento orbitale; ma anche fratture delle estremità)
- **Fratture non recenti e temporalmente indeterminate** (soprattutto del viso, delle estremità e della colonna vertebrale)
- **Lesioni dei tessuti molli** (ad es. ematoma e lacerazioni)

Valutazione dei risultati delle immagini e ruolo della radiologia

- I risultati radiologici e i dati di imaging contribuiscono a documentare l'entità delle lesioni fisiche.
- Le caratteristiche delle lesioni delle vittime adulte di violenza domestica sono simili a quelle di altre cause di lesione.
- Il valore predittivo positivo del solo esame radiologico per l'eventuale presenza di violenza domestica è limitato, ma può essere integrato



Maggiori informazioni sugli indicatori nel [Modulo 2](#).

- meglio e quindi potenziato considerando il contesto clinico generale, specie in caso di lesioni che non sono coerenti con il quadro clinico.
- Ad esempio lesioni che non sono plausibili in base al racconto fornito durante l'anamnesi, la presenza di lesioni multiple in diversi stadi, più o meno recenti e frequenti esami radiologici in passato.
 - Il punto di vista complementare del radiologo e la situazione spesso più tranquilla, durante la preparazione e la refertazione dei risultati degli esami (rispetto al pronto soccorso), possono più spesso facilitare l'individuazione della violenza domestica.

Fonti utili

Si possono trovare [qui](#).