

Tecken på våld i nära relationer i hals-ansiktsområdet (tandvård)

I denna tabell sammanfattas alla relevanta indikatorer på våld i nära relation i hals – ansiktsområdet.



Hitta mer information om **våld i nära relation och tandvård** [här](#).

Ben	Frakturer , t.ex. i över- och underkäke, kindben eller näsa
	Dislokationer och skador på käkleden
	Tecken på tidigare trauma mot tand- eller ansiktsstrukturer: tecken på läkta frakturer på röntgen
Tänder	Tandluckor, sprickor, frakturer eller flisor i tänderna → oftast överkåkens framtänder, följt av underkåkens framtänder och överkåkens hörntänder
	Dålig tandstatus
	Försummad tandhygien , uteblivna förebyggande kontroller, t.ex. hos äldre personer som inte får trasiga proteser lagade
	Erosion av tandemaljen på grund av bulimi och långvarig kvarhållning av spermier i munnen
	Högre risk för parodontit
Mjukvävnad	Ruptur av överläppens frenulum
	Skador på läpparna
	Hematom på tandkammarna eller i ansiktsvävnaden
	Inflammation i mungiporna
	Inflammation i tungan, högre risk för tandköttsinflammation
	Halitos, torr mun
	Tecken på sexuellt överförbara sjukdomar i munslemhinnan, t.ex. syfilis, akut HIV, herpes, papillom- eller candidainfektioner
	Blåmärken eller skrubbsår på den mjuka eller hårda gommen på grund av sexuella övergrepp
	Överdriven kräkreflex eller ingen alls
Petechiala kongestiva blödningar i munslemhinnan	