

Indicatori di violenza domestica nell'area collo-viso (dentisti)

Questa tabella riassume tutti gli indicatori rilevanti di violenza domestica nell'area collo-viso.



Maggiori informazioni sulla **violenza domestica e l'odontoiatria** in generale [qui](#).

Ossa	Fratture , per esempio del mascellare superiore e inferiore, zigomo o naso
	Lussazioni e lesioni dell'articolazione della mandibola
	Segni di precedenti traumi alle strutture dentali o orofacciali: segni di fratture guarite alla radiografia.
Denti	Edentulia traumatica, crepe, fratture o scheggiature dei denti, più frequentemente denti anteriori mascellari, seguiti da denti anteriori mandibolari e molari mascellari
	Condizioni dentali scadenti
	Igiene dentale trascurata, mancata partecipazione a controlli preventivi; ad esempio, negli anziani, mancata riparazione di protesi dentarie rotte.
	Erosione dello smalto dei denti dovuta a bulimia e ritenzione prolungata di sperma in bocca
	Maggiore rischio di parodontite
Tessuto molle	Rottura del frenulo del labbro superiore
	Lesioni alle labbra
	Ematoma sulle creste dentali o sul tessuto facciale
	Ragadi dell'angolo della bocca
	Infiammazione della lingua, rischio più elevato di gengivite
	Alitosi, secchezza delle fauci
	Segni di malattie sessualmente trasmissibili nella mucosa orale, ad esempio sifilide, HIV, herpes, papilloma o infezioni da candida
	Lividi o abrasioni del palato molle o duro dovuti ad abusi sessuali
Riflesso oro-faringeo eccessivo o assente	